

ОТЗЫВ

на автореферат диссертационной работы Короткевич Олеси Сергеевны на тему «Совершенствование диагностики и лечения пролапса тазовых органов у женщин в постменопаузе», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности - 3.1.4 – акушерство и гинекология

Диссертационная работа Короткевич О.С. посвящена поиску ранней диагностики и эффективному консервативному лечению пролапса тазовых органов у женщин в постменопаузальном периоде. Актуальность выбранной диссертантом темы обусловлена высокой частотой клинических проявлений пролапса тазовых органов у пациенток в постменопаузе, что негативно влияет на качество жизни женщины, а наличие нескольких соматических заболеваний у больных в постменопаузе может создавать кумулятивный эффект в отношении прогрессирующего течения данной патологии, что обуславливает не только медицинское, но и социальное значение данной проблемы.

В автореферате представлено логичное обоснование актуальности проведенного исследования, изложение научной новизны, теоретической и практической значимости работы.

Цель исследования сформулирована конкретно, для ее достижения автор обозначает 4 задачи, которые полностью соответствуют поставленной цели исследования. Дизайн исследования представлен двумя логично следующими друг за другом этапами, с точки зрения доказательной медицины обоснован. Методы исследования современные, статистическая обработка данных выполнена на высоком уровне.

Автором получены значимые для гинекологии и урологии сведения о клинических аспектах пролапса тазовых органов различной степени тяжести у женщин в постменопаузе. Результаты исследования позволили разработать новый метод диагностики степени пролапса тазовых органов у женщин с помощью вагинального зонда, который позволяет провести количественную оценку степени заболевания. Автором впервые доказано, что стратегия консервативной терапии пролапса тазовых органов 1-2 степени в виде тренировки мышц тазового дна при помощи специализированных физических упражнений у женщин в постменопаузе малоэффективна. В ходе исследования доказана клиническая эффективность тренировки мышц тазового дна при помощи статического вагинального тренажера в лечении пролапса тазовых органов 1-2 степени у женщин в постменопаузе.

