

## ОТЗЫВ

на автореферат диссертационной работы Короткевич Олеси Сергеевны на тему «Совершенствование диагностики и лечения пролапса тазовых органов у женщин в постменопаузе», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности - 3.1.4. – Акушерство и гинекология

Актуальность работы определяется социально-медицинской и медико-экономической направленностью проблемы. Пролапс тазовых органов и стрессовое недержание мочи отрицательно влияет на психоэмоциональную сферу жизни женщины, снижает ее трудоспособность и качество жизни. В связи с этим большое научное и практическое значение приобретает достижение поставленной цели - улучшение качества жизни женщин в постменопаузе с пролапсом тазовых органов с помощью эффективной диагностики и специализированной консервативной терапии. Выбранная диссертантом тема представляет интерес не только специалистам в сфере гинекологии, но будет небезынтересна урологам.

Автореферат содержит достаточное количество исходных данных, имеет пояснения, рисунки и таблицы. Написан квалифицированно и правильно оформлен. Работа выполнена в 2 этапа (ретроспективный и проспективный), на большом клиническом материале (1325 пациенток). Автором достигнута достаточная точность расчетов. Результаты собственных исследований включают клинико-anamnestические данные, сравнительную оценку диагностических методов исследования и оценку методов консервативного лечения женщин в постменопаузе.

Автором установлено, что разработанный метод диагностики степени пролапса тазовых органов с помощью вагинального зонда по сравнению с визуальной методикой Baden-Walker не различается по времени выполнения, однако обладает высокими показателями чувствительности и специфичности, так как основан на точных цифрах. Проведенное исследование позволило установить, что разработанный метод диагностики степени пролапса тазовых органов с помощью вагинального зонда сочетает в себе простоту и соответствие существующим, более сложным методам объективной оценки степени заболевания у женщин. Результаты исследования показали, что несмотря на выраженные инволютивные процессы в репродуктивной системе у женщин в постменопаузе, тренировка мышц тазового дна статическим вагинальным тренажером при пролапсе тазовых органов 1-2 степени, сопровождающимся явным или скрытым недержанием мочи, является эффективной техникой управления заболеванием у данной категории больных.

Выводы логично вытекают из поставленных задач. Практические рекомендации будут полезны для врачей амбулаторного звена – акушеров-гинекологов, урологов.

По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ, из них 6 статей в научных журналах, которые включены в перечень рецензируемых



